

## Тимчасові протипоказання для донорства крові та її компонентів

Перелік протипоказань до донорства	Усунення від донорства на:
Якщо Вам переливали кров	1 рік
Операції, у тому числі аборти	1 рік після операції
Нанесення татуювання, проколювання вух, лікування голковколуюванням, пірсинг	1 рік від часу закінчення процедур
Перебування в закордонних відрядженнях тривалістю більше 2-х місяців	6 місяців
Перебування в ендемічних з малярії країнах тропічного та субтропічного клімату (Азія, Африка, Південна та Центральна Америка) більше 3-х місяців	3 роки
Контакт з хворими на гепатити: гепатит А гепатит В, С	3 місяці 1 рік
Перенесені інфекційні захворювання (які не вказані в розділі «Абсолютні протипоказання»): малярія в анамнезі при відсутності симптомів і від'ємних результатах імунологічних тестів	3 роки
черевний тиф після одужання і повного клінічного обстеження при відсутності виражених функціональних розладів	1 рік
ангіна, грип, гостре респіраторно-вірусне захворювання (після одужання)	1 місяць
Виривання зубів	10 днів
Гострі або хронічні запальні процеси у стадії загострення (незалежно від їх локалізації). Температура тіла вище 37,0 град.С	1 місяць після закінчення гострого періоду
Вегето-судинна дистонія	1 місяць після нормалізації стану та відсутності симптомів
Алергічні захворювання	2 місяці після закінчення гострого періоду
Період вагітності та годування груддю	не раніше як через рік після пологів і не менше 3-х місяців після закінчення лактації
Період менструації	не менше 5-ти днів після

	закінчення менструації
<b>Щеплення:</b> вбитими та рекомбінантними вакцинами (гепатит В, правець, дифтерія, кашлюк, тиф та паратиф, холера, грип), анатоксинами живими вакцинами (бруцельоз, чума, туляремія, вакцина БЦЖ, віспа, краснуха, поліомієліт)	10 днів  1 місяць
введення протиправцевої сироватки (при відсутності виражених запальних явищ на місці ін'єкції)	1 рік  1 місяць
проти сказу	2 тижні
введення імуноглобуліну проти гепатиту В	
реакція Манту (при відсутності виражених запальних явищ на місці ін'єкції)	
Прийом лікарських препаратів: антибіотики анальгетики та саліцилати	2 тижні після закінчення курсу 10 днів після закінчення прийому
Вживання алкоголю	48 годин

### Інтервали між різними видами донорства (у днях)

Назва процедури	Наступні процедури		
	кроводача	плазмаферез	тромбоцитаферез
Кроводача	60	30	30
Плазмаферез апаратний: доза 500-800 мл	14	14	14
Плазмаферез ручний:	14	14	14
Тромбоцитаферез	14	14	14